

ANNELEER BABALAR DİKKAT!!!**Erken doğan bebeklerde daha fazla görülüyor**

Doğumdan sonraki ilk haftada az veya çok miktarda mutlaka bilirubin artışı olmaktadır. Normal zamanda doğan bebeklerin %60'ında, erken doğan bebeklerin ise %80'inde fizyolojik sarılık görülebilmektedir.

Sağlıklı Bebek**Yenidoğan Sarılığı Bulunan Bebek****! Fizyolojik sarılık beyinde hasara neden olabilir**

Sarılığın seviyesi yükseldiğinde tedavide gecikilirse aşırı derecede artan bilirubin beyinde birikir ve bu bölgede hasar oluşmasına neden olur.

Her ne kadar birçok bebekte tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçebilse de, fizyolojik sarılık geçiren bebekler mutlaka doktor kontrolü altında tutulmalıdır.

İleri düzeyde sarılık gelişmesi durumunda ışık tedavisinden kan değişimine kadar tedavi yöntemleri uygulanabilir.

! Uzun süren sarılığa dikkat!

Yeni doğan bebeklerde 14 günden uzun süren sarılık fizyolojik olarak kabul edilmeyip 'patolojik sarılık' olarak adlandırılır ve nedenleri araştırılmalıdır.

! Sarılık karaciğer yetmezliğine götürebilir

Erken dönem yetmezlikte ilaçlarla destek tedavisi verilebilirken, son dönem karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi karaciğer naklidir.

Bebeklerde ve çocuklarda en sık karaciğer nakli sebeplerinden birisi safra yollarının gelişmemesine bağlı olarak gelişen sarılıktır.

Bebek, sarılık ve renksiz kaka dışında gayet sağlıklı görünür.

Erken tanı konulup cerrahi girişim yapılmadığı durumlarda en geç bir yıl içinde safra birikimine bağlı siroz gelişerek bebekte karaciğer yetmezliğine sebep olur.

**✓ Sarılığın önlenmesinde anne sütü çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple olabildiğince erken dönemde anne sütüne başlamak çok önemlidir!!****ŞANLIURFA - SIVEREK
REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ****YENİDOĞAN SARILIĞI**